

1 DE CADA 25 GAYS, BISEXUALES Y OTROS HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (GBMSM) EN CANADÁ SE HA INFECTADO POR EL VHC A LO LARGO DE SU VIDA.

Las diversas prácticas de salud sexual y el consumo de sustancias en la comunidad gbMSM pueden aumentar las probabilidades de contraer el HCV, entre ellas:

- tener varias parejas sexuales, tanto por separado como en grupo
- vivir con el VIH
- vivir con hepatitis B
- tomar medicamentos para la profilaxis de preexposición al VIH (PPrE)
- vivir con sífilis, clamidia, HSV, VPH que causa llagas bucales, anales o genitales
- practicar PnP/chemsex y/o participar en determinadas actividades sexuales (por ejemplo, fisting, sexo en grupo)

Como parte de las revisiones rutinarias de salud sexual, las directrices para las pruebas del HCV recomiendan que los gbMSM se hagan anualmente la prueba del HCV.

Ten conversaciones abiertas y positivas desde el punto de vista sexual con los proveedores de servicios de salud sobre diversas prácticas sexuales.

GMSH
GAY MEN'S SEXUAL HEALTH ALLIANCE

Para obtener más información, consulta "*Sexual health and hepatitis C testing, care, and treatment for gay and bisexual men who have sex with men (gbMSM)*" (Salud sexual y pruebas, atención y tratamiento de la hepatitis C para hombres gays y bisexuales que tienen relaciones sexuales con hombres (gbMSM)).



Hoja de ruta para la erradicación de la hepatitis C en Ontario

