

L'HÉPATITE C ET LE CHEMSEX (PNP)

AVANT L'ACTIVITÉ :

assurez-vous qu'il y a suffisamment de nouveau matériel pour la consommation de drogues (seringues, matériel artisanal, pipes) pour éviter de le partager.

PENDANT L'ACTIVITÉ :

lorsque vous êtes sous l'effet de la drogue, vous êtes moins sensible à la douleur et êtes plus porté à vous engager dans des relations sexuelles agressives. Calmez-vous et prenez conscience de votre corps; dans certaines pratiques comme le fisting, envisagez un partenaire actif (top) sobre ou une personne observatrice sobre qui peut interrompre le jeu en cas de blessure.

LES RISQUES :

la consommation de drogue de synthèse pendant les relations sexuelles (nommé chemsex ou Party and Play - PnP), en particulier du GHB, des méthamphétamines, des nitrites de pentyle (poppers), et de la kétamine, peut augmenter les risques de contracter le VHC pour plusieurs raisons. Par exemple, les drogues peuvent vous engourdir face à la douleur, comme celle d'une déchirure, ce qui favorise la pénétration du virus dans la circulation sanguine.

LES STIGMATES ET LE SOUTIEN :

il est important d'avoir des conversations avec les prestataires des soins de santé, empreintes d'une attitude positive et ouverte sur les différentes pratiques sexuelles.

Trouvez des amis qui vous soutiennent au sein de la communauté du chemsex (PnP) avec qui vous pouvez avoir des discussions ouvertes relatives aux questions sur ce sujet.

SSHG
ALLIANCE POUR LA SANTÉ SEXUELLE
DES HOMMES GAIS

La fiche d'information Sexual health and hepatitis C testing, care, and treatment for gay and bisexual men who have sex with men (gbMSM) [en anglais] (la santé sexuelle et les tests de dépistage de l'hépatite C, ainsi que les traitements pour les hommes gais, bisexuels, et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (hommes gbHARSAH).



Chemsex

