

HEPATITIS C y PNP

ANTES:

Asegúrate de que hay una cantidad adecuada de materiales nuevos para el consumo de sustancias (jeringas, pipas) para evitar que se compartan.

DURANTE:

Cuando estás bajo los efectos de las drogas, es menos probable que notes el dolor y más probable que practiques sexo agresivo. Baja la intensidad y toma conciencia de tu cuerpo; para ciertas prácticas como el fisting, procura tener a alguien o un observador sobrio que pueda pausar la acción si se produce alguna lesión.

RIESGOS:

El consumo de sustancias durante las relaciones sexuales, especialmente el GHB, la metanfetamina, los poppers y la ketamina, puede aumentar el riesgo de contraer el HCV por varias razones posibles. Por ejemplo, las drogas pueden adormecernos ante dolores como los de las laceraciones, lo que facilita la entrada del virus en el torrente sanguíneo.

ESTIGMA Y APOYO:

ten conversaciones abiertas e inclusivas con tus proveedores de servicios de salud sobre tus prácticas sexuales.

Encuentra amigos en tu comunidad que te apoyen y con los que puedas hablar abiertamente de los problemas que surgen en el PnP.



Para obtener más información, consulta "*Sexual health and hepatitis C testing, care, and treatment for gay and bisexual men who have sex with men (gbMSM)*" (Salud sexual y pruebas, atención y tratamiento de la hepatitis C para hombres gays y bisexuales que tienen relaciones sexuales con hombres (gbMSM)).



Más información sobre
Fiesta y Juego

